

Verfahren	Material	Bemerkungen
U1-RNP-Antikörper	Serum 2 ml	<i>Indikation:</i> Mischkollagenosen, SLE, rheumatischer Formenkreis
Ubichinon 50	Serum 1 ml lichtgeschützt, Röhrchen mit Alu-Folie umwickeln	s. Coenzym Q10
UGP (Urinary Gonadotropic Peptide)	Urin 10 ml	<i>Indikation:</i> Diagnose und Verlaufskontrolle bei Ovarialkarzinomen
Ulcus molle-Direktnachweis	Abstrich Sekret Pusteleiter in Transportmedium mehrere dünne Ausstriche	<i>Erreger:</i> Haemophilus ducreyi s. mikrobiol. Diagnostik auch Ausschluß von Herpes genitalis, Chlamydien, Mykoplasmen, Gonorrhoe, Lues
(n)-Undecan	Serum 2 ml	= in Reinigungs- und Pflegemitteln
Uran	Urin 5 ml EDTA-Blut 2 ml Serum 2 ml Haare ca. 0.5 g	<i>Indikation:</i> Inhalation von Uranstäuben, Verdacht auf Intoxikation
Ureaplasma urealyticum	Urethral-, Vaginalabstrich Urin 10 ml	<i>Indikation:</i> Verdacht bei nicht- gonorrhöischer Urethritis des Mannes und bei Prostatitis
Urethritis Gonorrhoe / NGU Prostatitis Chlamydia trachomatis- Antigen-Nachweis Vaginosis/Fluor vaginalis	Urethral-, Vaginal-Abstrich, Urin 10 ml, Spezialkultur für Gonorrhoe, Spezialobjektträger für Chlamydien- Direktnachweis, Spezialkultur für Mycoplasmen u. Trichomonaden, Materialien auf Anforderung! Cervix-, Urethra-Abstrich, Chlamydien-Besteck, Objektträger Urethral-, Vaginal-Abstrich/-Sekret	<i>Indikation:</i> Zur Verifizierung oder Ausschluß einer Gonorrhoe, Chlamydien- und Mykoplasmen-Infektion
Urin-Disk-Elektrophorese (SDS-PAGE)	10 ml Urin von 24h-Sammelurin, Sammelmenge angeben	<i>Indikation:</i> Differentialdiagnose der Proteinurien, Differenzierung von Nephropathien nach glomerulärer und/oder tubu- lärer Genese, Lokalisation der Nierenschädigung, Frühdiagnostik einer Nierenbeteiligung bei Systemerkrankungen wie Diabetes mellitus, Hypertonie, LE etc.
Urin-Elektrophorese	Urin 5 ml	
Urin-Kultur Harnwegsinfektionen	Mittelstrahlurin 5 ml Katheterurin 5 ml Blasenpunktionsurin 5 ml Nährbodenträger	<i>Indikation:</i> Verdacht auf bakterielle Infektion des Urogenitaltrakts
Urinsediment	Urin 5 ml	

Verfahren	Material	Bemerkungen
Urinstatus <i>Labor:</i> Nitrit pH Eiweiß Glucose Keton Urobilinogen Bilirubin spezifisches Gewicht Blut Sedimentmikroskopie	10 ml frischer Morgenurin	s. Harnstatus
Uro-Synthase	Heparinblut 1 ml	s. Uroporphyrinogen I-Synthase
Urobilin	10 ml von 24h-Sammelurin, Sammelmenge angeben	<i>Indikation:</i> Störungen des enterohepatischen Kreislaufs
Urobilinogen	Urin 5 ml	<i>Indikation:</i> Störungen des enterohepatischen Kreislaufs
Urogenitaltrakt-Infektionen	versch. mikrobiol. Materialien, Abstriche mehrfach von Zervix, Vagina, Sekret auf Objektträger	s. Papillom-Viren s. Herpes-Virus
Uroporphyrine	10 ml von 24h-Sammelurin, Sammelmenge angeben	<i>Indikation:</i> Verdacht auf erythrozytäre, toxische oder hepatische Porphyrines s. Porphyrine
Uroporphyrinogen I- Synthase (Uro-Synthase)	Heparinblut 1 ml	<i>Indikation:</i> Verdacht auf erythrozytäre, toxische oder hepatische Porphyrines
Urtikaria	Serum 2 ml	s. Allergie-Diagnostik
Uveitis	Serum 2 ml EDTA-Blut 10 ml Heparinblut 10 ml	s. Erreger-Screening , oculotrope Erreger