

Verfahren	Material	Bemerkungen
Yersinien Yersinien-Direktnachweis Y. enterocolitica Y. pseudotuberculosis Kultur DNA-Nachweis Yersinien-Antikörper Y. enterocolitica O3 Y. enterocolitica O9 Y. pseudotuberculosis	bohnengroße Stuhlproben 2 g, von 3 versch. Tagen Serum 2 ml	<i>Indikation:</i> z.B. Yersinia enterocolitica Yersinia pseudotuberculosis akute fieberhafte Gastroenteritis, Pseudoappendizitis mesenteriale Lymphadenitis <i>Indikation:</i> akute fieberhafte Gastroenteritis, Pseudoappendizitis, mesenteriale Lymphadenitis, reaktive Arthritiden zur Diagnose einer frischen Infektion Titerverlauf (2. Serum nach 10-14 Tg) s. Infektionsdiagnostik s. Magen-Darm-Infektionen
Yersinia pseudotuberculosis Kultur DNA-Nachweis	OP-Material (z.B. Lymphknoten Punktionseiter)	
Yo - AK	Serum 1 ml	= Purkinje-Zell-AAK <i>Indikation:</i> paraneoplastisches Kleinhirn-Syndrom
Ytterbium	Urin 5 ml	= Element