

## / GNRH-TEST

### SEHR GEEHRTE PATIENTIN, SEHR GEEHRTER PATIENT,

Ihr Arzt hat Ihnen mitgeteilt, dass ein Gonadotropin-Releasinghormon-Test bei Ihnen durchgeführt werden sollte.

Das Gonadotropin-Releasinghormon, abgekürzt GnRH, ist ein Hormon, welches in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) entsteht und für die Steuerung der Freisetzung weiterer geschlechtsspezifische Sexualhormone verantwortlich ist. Nachdem im Rahmen dieses Tests die Hormonwerte bestimmt wurden, kann Ihr Arzt zu wichtigen Schlussfolgerungen kommen, die für die weitere Behandlung von Bedeutung sind.

Um die Hormonwerte zu bestimmen, muss Ihnen zunächst eine Venenverweilkanüle gelegt und Blut abgenommen werden. Im Anschluss folgt die Verabreichung der Testsubstanz über die liegende Venenverweilkanüle. Es wird einmal bzw. zwei- bis dreimal zu unterschiedlichen Zeiten nochmal Blut abgenommen.

Zu beachten ist, dass manche Medikamente vor dem Test abgesetzt werden müssen. Dies sollte mit Ihrem behandelnden Arzt besprochen werden.

Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, was vor und am Tag des Testes berücksichtigt werden muss.

**Wichtig: Dieser Test darf nicht bei einer bestehenden Schwangerschaft durchgeführt werden. Falls Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt darüber.**

## / WICHTIGE INFORMATIONEN BZGL. DER VORBEREITUNG

### ERNÄHRUNG

Es ist nicht notwendig für diesen Test nüchtern zu sein

### MEDIKAMENTE

Es sollte im Vorfeld mit Ihrem Arzt besprochen werden, welche Medikamente vor dem Test nicht eingenommen werden dürfen. Bitte beachten Sie, dass insbesondere Testosteronhaltige Medikamente oder Präparate wie Gele oder Pflaster vorher abgesetzt werden müssen.

### ABLAUF

- Die Durchführung des Testes wird im Liegen vorgenommen.
- Es wird Ihnen eine Venenverweilkanüle gelegt.
- Die Blutentnahmen erfolgen aus dieser Kanüle
- Die Testsubstanz wird durch die Venenverweilkanüle verabreicht
- Zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen Blutentnahmen aus dieser Kanüle

### NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### NACH DEM TEST

Sie können sich auf den Nachhauseweg machen. Ihre Fahrtauglichkeit ist nicht beeinträchtigt.